

code	レジメン名	L1040S	D-Ld療法(1サイクル目)
L010H	R-CHOP	L1041S	D-Ld療法(2サイクル目)
L011H	R-CHOP+MAD	L1042S	D-Ld療法(3-6サイクル目)
L030H	CHOP	L1043S	D-Ld療法(7サイクル目以降)
L031H	CHOP+MAD	L1050S	D-Bd療法(1サイクル目)
L040H	R-THP-COP(初回)	L1051S	D-Bd療法(2-3サイクル目)
L050H	R-THP-COP(2回目以降)	L1052S	D-Bd療法(4-8サイクル目)
L060S	Ritximab単剤	L1053S	D-Bd療法(9サイクル目以降)
L090M	アザチジン療法(静注)	L1060S	D-VMP療法(1サイクル目)
L091M	アザチジン療法(皮下注)	L1061S	D-VMP療法(2-9サイクル目)
L092M	アザチジン療法(静注+皮下注)	L1062S	D-VMP療法(10サイクル目以降)
L100H	ABVD療法	L1070M	AraC単剤
L110H	COPP療法	L1080S	VLB+PSL(導入)
L120M	R+BND療法	L1081S	VLB+PSL(維持)
L130M	Bendamustine単独療法	L1090H	CEOP
L140S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法(静注)	L1091H	R-CEOP
L141S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(3W)療法(皮下注)	L1092H	G-CEOP(1サイクル目)
L150S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法(静注)	L1093H	G-CEOP(2サイクル目以降)
L151S	ホルテゾミブ/デキサメタゾン(5W)療法(皮下注)	L1100H	A+CHP
L152S	VCD療法	L1120L	ペントスタチン
L160H	ESHAP療法	L1130M	Venetoclax+Azacitidine(静注)
L161H	R-ESHAP療法	L1131M	Venetoclax+Azacitidine(皮下注)
L170M	CAG(G:ノイトロジン)療法	L1140M	Special C
L180M	CAG(G:フィルグラスチム)療法	L1150S	inotuzumab ozogamicin(1サイクル目)
L210S	ネララビン療法	L1151S	inotuzumab ozogamicin(非寛解:2-6サイクル目)
L740L	Brentuximab Vedotin(BV)療法	L1152S	inotuzumab ozogamicin(寛解:2-6サイクル目)
L750S	モガムリズマブ単独療法	L1170S	Isa-Pd療法(1コース目)
L800M	AI療法	L1171S	Isa-Pd療法(2コース目以降)
L860S	KLd療法(1サイクル目)	L1180M	Pola+RB療法(1サイクル目)
L861S	KLd療法(2-12サイクル目)	L1181M	Pola+RB療法(2-6サイクル目)
L862S	KLd療法(13サイクル目以降)	L1190S	DKd療法(1サイクル目)
L870S	E-Ld療法(1,2サイクル目)	L1191S	DKd療法(2サイクル目)
L871S	E-Ld療法(3サイクル目以降)	L1192S	DKd療法(3-6サイクル目)
L880M	FCR	L1193S	DKd療法(7サイクル目以降)
L890S	オファツムマブ 初回	L1470H	Pola+R-CHP(1-6コース目)2日投与
L891S	オファツムマブ 2~8回目	L1471H	Pola+R-CHP(2-6コース目)1日投与
L892S	オファツムマブ 9~12回目	L1472S	Pola+R-CHP(7-8コース目)
L900S	alemtuzumab(3mg)	L1480S	Venetoclax+LDAC(静注)
L901S	alemtuzumab(10mg)	L1481S	Venetoclax+LDAC(皮下注)
L902S	alemtuzumab(30mg)	L1550S	Isa-Kd療法(1サイクル目)
L910M	CHASER	L1551S	Isa-Kd療法(2サイクル目以降)
L930L	プララトレキサート単独療法	L1580S	BLd
L940S	gemtuzumab ozogamicin	L1590S	Elranatamab(C1)
L950M	JLSG-02 Induction A	L1591S	Elranatamab(C2-6)
L951M	JLSG-02 Maintenance A	L1592S	Elranatamab(C7-)
L952M	JLSG-02 Maintenance C	L1600S	Epcoritamab(C1)
L970H	G-CHOP(1サイクル目)	L1601S	Epcoritamab(C2-3)
L971H	G-CHOP(2サイクル目以降)	L1602S	Epcoritamab(C4-9)
L972S	GAZYVA(維持療法)	L1603S	Epcoritamab(C10-)
L980M	G-B(1サイクル目)	L1610M	Vyxeos 寛解導入第1コース
L981M	G-B(2サイクル目以降)	L1611M	Vyxeos 寛解導入第2コース
L1000H	ドキシソルビシン単剤	L1620M	Vyxeos 地固め療法
L1010H	A+AVD療法		
L1020S	Nivolumab単剤(ホジキンリンパ腫)		
L1030S	Pembrolizumab単剤(ホジキンリンパ腫)		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L011H

診療科	申請医師	備考欄
LR-CHOP+MAD		
悪性リンパ腫		
治療目的		

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴静注	day1
ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2
メトトレキサート	15	mg		髄腔内	day2
シタラビン	40	mg		髄腔内	day2
デカドロン	4	mg		髄腔内	day2

投与周期 21日 休薬

薬品名・規格	投与量	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
アタラックスP	25 mg	内服		●							
カロナール	400 mg	内服		●							
リツキシマブBS	375 mg/m ²	側管点滴		●							
生食	337.5 mL/m ²	側管点滴	25→200mL/hr	●							
生食	100 mL	側管点滴	inotuzumab ozogamicin (非寛解: 2-6サイクル目)		●						
生食	100 mL	側管点滴	inotuzumab ozogamicin (寛解)		●						
パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注	15分		●						
ドキシソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注			●						
生食	100 mL	点滴静注	30分		●						
オンコビン	1.4 mg/m ²	点滴静注			●						
生食	50 mL	点滴静注	全開		●						
エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注			●						
生食	500 mL	点滴静注	2時間		●						
生食	3 mL				●						
メソトレキサート注5mg	15 mg				●						
キロサイド注20mg	40 mg				●						
デカドロン注射液1.65mg	3.3 mg		ゆっくり		●						
合計	6 mL	髄腔内	2~3分で		●						
プレドニン	100 mg/body	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L030H

診療科	申請医師	備考欄
U CHOP		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
対悪性リンパ腫		
治療目的		

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴静注	day1
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1

投与周期 21日

休薬

R 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
					●							
生食	100	mL	点滴	フラッシュ	●							
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注		●							
生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)												
オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注	inotuzumab	●							
生食	50	mL	点滴静注	全開	●							
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注		●							
生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L031H

診療科 申請医師
 LCHOP+MAD
 悪性リンパ腫
 治療目的

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴静注	day1
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1
メトレキサート	15	mg		髄腔内	day1
シタラビン	40	mg		髄腔内	day1
デカドロン	4	mg		髄腔内	day1

投与周期

休薬

薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注		●							
生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注		●							
生食	50	mL	点滴静注	inotuzumab	●							
				inotuzumab ozogamicin (寛解: 2-6サイクル目)								
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注		●							
生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
生食	3	mL			●							
メトレキサート注5m	15	mg			●							
キロサイド注20mg	40	mg			●							
デカドロン注射液1.65	3.3	mg		ゆっくり	●							
合計	6	mL	髄腔内	2~3分で	●							
プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L040H

診療科 申請医師 備考欄

LR-THP-COP(初回)

悪性リンパ腫

治療目的

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ピノルビン	50	mg/m ²		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴静注	day1
	1mg/mLに調整				

投与周期 21日

休薬

薬品名・規格	投与量	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
ポララミン	2mg	内服		●							
ブルフェン	200mg	内服		●							
生食	100mL	点滴静注	25mL/hr		●						
リツキシマブBS	375mg/m ²	点滴静注	25mL/hr	●							
生食	337.5mL/m ²	点滴静注	inotuzumab	●							
			inotuzumab ozogamicin (寛解: 2-6サイクル目)								
			200mL/hr								
パロノセトロンバッグ	0.75mg	点滴静注			●						
デカドロン	6.6mg	点滴静注	15分		●						
生食	100mL	点滴静注	フラッシュ		●						
ピノルビン	50mg/m ²	点滴静注			●						
5%ブドウ糖	100mL	点滴静注	30分		●						
オンコビン	1.4mg/m ²	点滴静注			●						
生食	50mL	点滴静注	全開		●						
エンドキサン	750mg/m ²	点滴静注			●						
生食	500mL	点滴静注	2時間		●						
生食	100mL	点滴静注	フラッシュ		●						
プレドニン	100mg/bd	内服			●	●	●	●	●		
アブレピタント	125/80mg	内服			●125	●80	●80				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L050H

診療科
 LR-THP-COP(2回目以降)
 悪性リンパ腫
 治療目的

申請医師

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ピノルビン	50	mg/m ²		点滴静注	day1
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5
リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴静注	day1
	1mg/mLに調整				

投与周期 21日

休薬

薬品名・規格	投与量	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
ポララミン	2mg	内服		●							
ブルフェン	200mg	内服		●							
生食	100mL	点滴静注	×	●							
パロノセトロンバッグ	0.75mg	点滴静注		●							
デカドロン	6.6mg	点滴静注	inotuzumab	●							
			inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)								
生食	100mL	点滴静注	フラッシュ	●							
リツキシマブBS	375mg/m ²	点滴静注	100mL/hr	●							
生食	337.5mL/m ²	点滴静注	200mL/hr	●							
生食	100mL	点滴静注	フラッシュ	●							
ピノルビン	50mg/m ²	点滴静注		●							
5%ブドウ糖	100mL	点滴静注	30分	●							
オンコビン	1.4mg/m ²	点滴静注		●							
生食	50mL	点滴静注	全開	●							
エンドキサン	750mg/m ²	点滴静注		●							
生食	500mL	点滴静注	2時間	●							
生食	100mL	点滴静注	フラッシュ	●							
プレドニン	100mg/body	内服		●	●	●	●	●			
アプレピタント	125/80mg	内服		●125	●80	●80					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L161H

診療科 申請医師

UR-ESHAP療法

再発性非ホジキンリンパ腫

備考欄

治療目的

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
ラステット	40	mg/m ²	点滴静注	day2-5
シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注	day2-5
キロサイド	2000	mg/m ²	点滴静注	day6
ソル・メドロール	250	mg/bd	点滴静注	day2-6

投与周期

休薬

薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3-5)	day(6)	day()	day()	day()	day()
アタラックスP	25	mg	内服		●							
カロナール	400	mg	内服		●							
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25mL/hr	●							
生食	337.5	mL/m ²	点滴静注	100mL/hr	●							
				200mL/hr								
パノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	zogamicin (非寛解:2-6サイクル目)		●						
				inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)								
生食	100	mL	点滴静注			●	●	●				
ソル・メドロール	250	mg/bd	点滴静注	15分		●	●	●				
生食	250	mL	点滴静注			●	●					
ラステット	40	mg/m ²	点滴静注	1時間		●	●					
生食	500	mL	点滴静注			●	●					
シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注	24時間		●	●					
生食	500	mL	点滴静注					●				
キロサイド	2000	mg/m ²	点滴静注	2時間				●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 L910M

診療科 申請医師

備考欄

U CHASER

再発・難治性の悪性リンパ腫

術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴静注	day3
キロサイド	2	g/m ²	点滴静注	day4-5
ラストット	100	mg/m ²	点滴静注	day3-5
デカドロン	33	mg/m ²	点滴静注	day3-5

投与周期 21日
 休薬 16日

F 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
アタラックスP	25	mg	内服		●							
カロナール	400	mg	内服		●							
生食	500	mL	点滴静注	6時間	●							
生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●							
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
inotuzumab ozogamicin (非寛解: 2-6サイクル目)												
ソルデム6	2000	mL	持続点滴	zogamicin (寛解: 2-6サイクル目)		●	●					
メイロン 7%	80	mL	持続点滴	24時間		●	●					
生食	50	mL	点滴静注					●	●			
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注				●					
デカドロン	33	mg	点滴静注	15分			●	●	●			
生食	1000	mL	持続点滴	24時間				●	●			
生食	500	mL	点滴静注				●					
エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴静注	3時間			●					
生食	250	mL	点滴静注				●	●	●			
ラストット	100	mg/m ²	点滴静注	1時間			●	●	●			
生食	500	mL	点滴静注					●	●			
キロサイド	2	g/m ²	点滴静注	3時間				●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L950M

診療科 申請医師

UJLSG-02 Induction A
 Langerhans cell histiocytosis

治療目的
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
キロサイド	100	mg/m		点滴静注	day1-5,15-19,29-33
オンコピン	0.05	mg/kg	2mg	点滴静注	day1,15,29
プレドニン	2	mg/kg	60mg/day	内服	day1-28
プレドニン	1	mg/kg	60mg/day	内服	day29-35
プレドニン	0.5	mg/kg	60mg/day	内服	day36-42

備考欄

投与周期 42日
 休薬

薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2-5)	day(6-14)	day(15)	day(16-19)	day(20-28)	day(29)	day(30-33)	day(34-35)	day(36-42)
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●			●			●			
生食	50	mL	点滴静注		●			●			●			
オンコピン	0.05	mg/kg	点滴静注	5分	●			●			●			
生食	500	mL	点滴静注		●	●		●	●		●	●		
キロサイド	100	mg/m	点滴静注	6時間	●	●		●	●		●	●		
プレドニン	2	mg/kg	内服		inotuzumab ozogamicin (非寛解: 2-6サイクル目)									
			inotuzumab		●	●	●	●	●	●				
プレドニン	1	mg/kg	内服								●	●	●	
プレドニン	0.5	mg/kg	内服											●

レジメン記入フォーマット

登録番号 L970H

診療科	申請医師	備考欄
LIG-CHOP (1サイクル目)		
CD20陽性濾胞性リンパ腫		
治療目的		

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1,8,15
ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6

投与周期 21日 休薬

薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3-6)	day(8)	day(15)	day()	day()	day()
					●	●		●	●			
生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●		●	●			
生食	50	mL	点滴静注		●			●	●			
デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●			●	●			
生食	100	mL	点滴静注	1時間	●			●	●			
アタラックスP	25	mg	内服	inotuzumab ozogam	●			●	●			
カロナール	400	mg	内服	inotuzumab ozogam	●			●	●			
生食	210	mL	点滴静注		●			●	●			
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●			●	●			
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
プレドニン	100	mg/bd	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L971H

診療科 申請医師 備考欄

LIG-CHOP (2サイクル目以降)
CD20陽性濾胞性リンパ腫
 治療目的

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1
ドキシソルビシン	50	mg/m ²		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6

投与周期 21日

休薬

薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3-6)	day()				
					●	●	●	●	●	●	●	●
生食	100	mL	点滴	フラッシュ	●	●						
生食	50	mL	点滴静注		●							
デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
アタラックスP	25	mg	内服	inotuzumab ozogam	●							
カロナール	400	mg	内服	inotuzumab ozogam	●							
生食	210	mL	点滴静注		●							
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→100mL/hr	●							
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注			●						
生食	100	mL	点滴静注	30分		●						
オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注			●						
生食	50	mL	点滴静注	全開		●						
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注			●						
生食	500	mL	点滴静注	2時間		●						
プレドニン	100	mg/bd	内服			●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L980M

診療科	申請医師	備考欄
IG-B (1サイクル目)		
CD20陽性濾胞性リンパ腫		
治療目的		

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1,8,15
トレアキシ	90	mg/m	点滴静注	day2,3

投与周期 28日 休薬

R 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)	day(15)	day()	day()	day()
生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●	●	●	●			
生食	50	mL	点滴静注		●			●	●			
デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●			●	●			
生食	100	mL	点滴静注	1時間	●			●	●			
アタラックスP	25	mg	内服	inotuzumab ozogan	●			●	●			
カロナール	400	mg	内服	inotuzumab ozogan	●			●	●			
生食	210	mL	点滴静注		●			●	●			
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	12.5→100mL/hr	●			●	●			
生食	50	mL	点滴静注				●					
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
生食	50	mL	点滴静注			●	●					
トレアキシ	90	mg/m	点滴静注			●	●					
注射用水	36	mL/m	点滴静注	10分		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L981M

診療科	申請医師	備考欄
IG-B (2サイクル目以降)		<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
CD20陽性濾胞性リンパ腫		
治療目的		

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	day1,8,15
トレアキシン	90	mg/m ²	点滴静注	day2,3

投与周期 28日

休薬

薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day()				
生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●	●					
生食	50	mL	点滴静注		●							
デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
アタラックスP	25	mg	内服	inotuzumab ozogam	●							
カロナール	400	mg	内服	inotuzumab ozogam	●							
生食	210	mL	点滴静注		●							
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→100mL/hr	●							
生食	50	mL	点滴静注				●					
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注			●						
デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分		●	●					
生食	50	mL	点滴静注			●	●					
トレアキシン	90	mg/m ²	点滴静注			●	●					
注射用水	36	mL/m ²	点滴静注	10分		●	●					

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1000M

診療科 申請医師

備考欄

ドキシソルピシン単剤
 悪性軟部肉腫
 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ドキシソルピシン	75	mg/m ²	点滴静注	day1

投与周期 21日
 休薬

R 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day()						
					●							
生食	100	mL	点滴静注		●							
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
生食	100	mL	点滴静注		●							
ドキシソルピシン	75	mg/m ²	点滴静注	30分	●							

inotuzumab ozogamicin (非寛解: 2-6サイクル目)

inotuzumab ozogamicin (寛解: 2-6サイクル目)

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1010H

診療科 申請医師 備考欄

LA+AVD療法
 対ホジキンリンパ腫

治療目的

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
アドセトリス	1.2	mg/kg		点滴静注	day1,15
ドキソルビシン	25	mg/m ²		点滴静注	day1,15
エクザール	6	mg/m ²	10mg	点滴静注	day1,15
ダカルバジン	375	mg/m ²		点滴静注	day1,15

投与周期 28日
 休薬

R 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(15)	day()					
					●	●						
生食	100	mL	点滴静注	 	●	●						
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●						
デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
生食	100	mL	点滴静注		●	●						
ドキソルビシン	25	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●						
inotuzumab ozogamicin (非寛解: 2-6サイクル目)												
生食	50	mL	点滴静注	gamycin (寛解)	●	●						
エクザール	6	mg/m ²	点滴静注	全開	●	●						
生食	50	mL	点滴静注		●	●						
ダカルバジン	375	mg/m ²	点滴静注	15分	●	●						
生食	50	mL	点滴静注	 	●	●						
生食	100	mL	点滴静注		●	●						
注射用水	0.24	mL/kg	点滴静注		●	●						
アドセトリス	1.2	mg/kg	点滴静注	30分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1020S

診療科 申請医師

備考欄

Nivolumab単剤 (ホジキンリンパ腫)
 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫
 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名 標準投与量 単位 投与経路 投与日

オブジーボ	240	mg/bd	点滴静注	day1

投与周期 14日

R	薬品名・規格	投与量	投与ル	点滴時間	day(1)	day()						
	生食	100 mL	点滴静注	 	●							
	生食	100 mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	240 mg/bd	点滴静注	30分	●							

inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)

inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1040S

診療科 申請医師

備考欄

LD-Ld療法(1サイクル目)
 多発性骨髄腫
術前 術後補助 再発・進行
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
レブラミド	25	mg/bd	内服	day1-21
レナデックス	20	mg/bd	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日
 休薬

F 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(21)	day(22)	day(23)
					●	●	●	●	●	●	●	●	●
アタラックスP	25	mg/bd	内服		●		●		●			●	
カロナール	600	mg/bd	内服		●		●		●			●	
レナデックス	20	mg/bd	内服		●	●	●	●	●	●		●	●
(ダラザレックス投与1時間前までに)													
inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)													
生食	100	mL	点滴静注	inotuzumab ozd	●		●		●			●	
生食	1000	mL	点滴静注		●								
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h	●								
生食	500	mL	点滴静注				●						
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h			●						
生食	500	mL	点滴静注						●			●	
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h					●			●	
レブラミド	25	mg/bd	内服		← day 1 - 21 連日経口投与 →								

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1050S

診療科 申請医師

備考欄

LD-Bd療法(1サイクル目)

多発性骨髄腫

術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,8,15
ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,4,8,11
レナデックス	20	mg/bd	内服	day1,2,4,5,8,9,11,12

投与周期 21日
 休薬

F薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(4)	day(5)	day(8)	day(9)	day(11)	day(12)	day(15)
					●	●	●	●	●	●	●	●	●
アタラックスP	25	mg/bd	内服		●				●				●
カロナール	600	mg/bd	内服		●				●				●
レナデックス	20	mg/bd	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
(ダラザレックス投与1時間前までに)													
生食	100	mL	点滴静注	inotuzumab oz	●				●				●
inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)													
生食	50	mL	点滴静注										●
デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分									●
生食	100	mL	点滴静注	1時間									●
生食	1000	mL	点滴静注		●								
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h	●								
生食	500	mL	点滴静注						●				
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h					●				
生食	500	mL	点滴静注										●
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h									●
ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注		●		●		●		●		
生食	0.52	mL/m ²	皮下注		●		●		●		●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1061S

診療科 申請医師

備考欄

LD-VMP療法(2-9サイクル目)

対多発性骨髄腫

注 術前 術後補助 再発・進行

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,22
ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注	day1,8,22,29
アルケラン	9	mg/m ²	内服	day1-4
プレドニン	60	mg/m ²	内服	day2-4

投与周期 42日
 休薬

R	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	day(1)	day(2-3)	day(4)	day(8)	day(22)	day(29)	day()	day()	day()
	アタラックスP	25	mg/bc	内服		●				●				
	カロナール	600	mg/bc	内服		●				●				
	レナデックス	20	mg/bc	内服		●				●				
	(ダラザレックス投与1時間前までに)													
	生食	100	mL	点滴静注	点滴静注	●				●				
	生食	500	mL	点滴静注	gamicin (非寛解)	●				●				
	ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	totuzumab-ozogamicin (寛解 2-9サイクル目)	●				●				
	ベルケイド	1.3	mg/m ²	皮下注		●			●	●	●			
	生食	0.52	mL/m ²	皮下注		●			●	●	●			
	アルケラン	9	mg/m ²	内服		●	●	●						
	プレドニン	60	mg/m ²	内服			●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1090H

診療科	申請医師	備考欄
UCEOP		<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
非ホジキンリンパ腫		
治療目的		

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day1
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/body		内服	day1-5
ラステット	100	mg/m ²		内服	day2-3

投与周期 21日 休薬

R 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
					生食	100	mL	点滴	フラッシュ	●		
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
生食	500	mL	点滴静注		●							
ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)												
生食	50	mL	点滴静注	inotuzumab oz	●							
オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開	●							
生食	500	mL	点滴静注		●							
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
プレドニン	100	mg/body	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1091H

診療科 UR-CEOP 申請医師
 非ホジキンリンパ腫
 治療目的

備考欄

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
リツキシマブBS	375	mg/m ²		点滴静注	day1
	1mg/mLに調整				
ラステット	100	mg/m ²		内服	day3-4

投与周期 21日

休薬

R 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
アタラックスP	25	mg	内服		●							
カロナール	400	mg	内服		●							
生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●							
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	25→200mL/hr	●							
生食	100	mL	点滴静注			●						
				inotuzumab ozogamicin (非寛解:								
				inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)								
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
生食	500	mL	点滴静注			●						
ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
生食	50	mL	点滴静注			●						
オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開		●						
生食	500	mL	点滴静注			●						
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
ラステットCap	100	mg/m ²	内服				●	●				
プレドニン	100	mg/bd	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1093H

診療科 申請医師

備考欄

IG-CEOP (2サイクル目以降)

非ホジキンリンパ腫

治療目的

薬品名	標準投与量	単位	最大量	投与経路	投与日
ガザイバ	1000	mg		点滴静注	day1
ラステット	50	mg/m ²		点滴静注	day2
オンコビン	1.4	mg/m ²	2mg	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/m ²		点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/body		内服	day2-6
ラステット	100	mg/m ²		内服	day3-4

投与周期 21日

休薬

R 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
生食	100	mL	点滴静注	フラッシュ	●	●						
生食	50	mL	点滴静注		●							
デカドロン	19.8	mg	点滴静注	15分	●							
生食	100	mL	点滴静注	1時間	●							
				inotuzumab ozogamicin (非寛解: 2-6サイクル目)								
アタラックスP	25	mg	内服	inotuzumab ozogam	●							
カロナール	400	mg	内服		●							
生食	210	mL	点滴静注		●							
ガザイバ	1000	mg	点滴静注	25→100mL/hr	●							
パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分		●						
生食	500	mL	点滴静注			●						
ラステット	50	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
生食	50	mL	点滴静注			●						
オンコビン	1.4	mg/m ²	点滴静注	全開		●						
生食	500	mL	点滴静注			●						
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	2時間		●						
ラステットCap	100	mg/m ²	内服				●	●				
プレドニン	100	mg/bd	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1190S

診療科 申請医師

備考欄

LDKd療法(1サイクル目)

多発性骨髄腫

治療目的

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	8	mg/kg	点滴静注	day1,2
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day8,15,22
カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	day1,2
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day8,9,15,16
レナデックス	40	mg/w	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期 28日
 休薬

薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day()	day()
アタラックスP	25	mg/bd	内服		●	●	●		●		●		
カロナール	400	mg/bd	内服		●	●	●		●		●		
レナデックス	20	mg/bd	内服		●	●	●	●	●	●			
レナデックス	40	mg/bd	内服	inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)								●	
(投与開始1時間前までに)		inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)											
生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●	●	●	●	●		
生食	500	mL	点滴静注		●	●							
ダラザレックス	8	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h	●	●							
生食	500	mL	点滴静注				●		●				
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	50→200mL/h			●		●				
生食	500	mL	点滴静注								●		
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h							●		
5% 糖液	100	mL	点滴静注	 	●	●	●		●				
5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●							
注射用水	10	mL/m	点滴静注		●	●							
カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●							
5% 糖液	100	mL	点滴静注				●	●	●	●			
注射用水	28	mL/m	点滴静注				●	●	●	●			
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	30分			●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1192S

診療科 申請医師

備考欄

LDKd療法(3-6サイクル目)

多発性骨髄腫

治療目的

治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1,15
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	40	mg/w	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期 28日
休薬

F 薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day()	day()
					●	●	●	●	●	●	●	●	●
アタラックスP	25	mg/bc	内服		●				●				
カロナール	400	mg/bc	内服		●				●				
レナデックス	20	mg/bc	内服		●	●	●	●	●	●			
レナデックス	40	mg/bc	内服	inotuzumab ozogamicin (非寛解:2-6サイクル目)							●		
(投与開始1時間前までに)		inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)											
生食	100	mL	点滴静注	100→200mL/h	●	●	●	●	●	●			
生食	500	mL	点滴静注		●				●				
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h	●				●				
5% 糖液	100	mL	点滴静注	100→200mL/h	●				●				
5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
注射用水	28	mL/m	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1193S

診療科 申請医師

備考欄

LDKd療法(7サイクル目以降)
 多発性骨髄腫
 治療目的
 治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	day1
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	40	mg/w	内服	day1,2,8,9,15,16,22

投与周期 28日
 休薬

F 薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day()	day()
アタラックスP	25	mg/bc	内服		●								
カロナール	400	mg/bc	内服		●								
レナデックス	20	mg/bc	内服		●	●	●	●	●	●			
レナデックス	40	mg/bc	内服								●		
(投与開始1時間前までに)		inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)											
生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●	●	●	●			
生食	500	mL	点滴静注		●								
ダラザレックス	16	mg/kg	点滴静注	100→200mL/h	●								
5% 糖液	100	mL	点滴静注	 	●								
5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
注射用水	28	mL/m	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1470H

診療科 申請医師 備考欄

L Pola+R-CHP(1-6コース目)2日投与

未 治療のDLBCL

治療目的

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
	1mg/mLに調整			
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day2
ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注	day2
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	day2
プレドニン	100	mg/日	内服	day2-6

投与周期 21日

休薬

R	薬品名・規格	投与量	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day()	day()
	アタラックスP	25 mg	内服		●	●						
	カロナール	400 mg	内服		●	●						
	生食	100 mL	点滴静注		●	●						
	生食	337.5 mL/m ²	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375 mg/m ²	点滴静注		●							
	inotuzumab ozogamicin (寛解: 2-6サイクル目)											
	生食	100 mL	点滴静注			●						
	注射用水	0.09 mL/kg	点滴静注			●						
	ポライビー	1.8 mg/kg	点滴静注	90→30分		●						
	生食	50 mL	点滴静注	フラッシュ		●						
	パロノセトロンバッグ	0.75 mg	点滴静注	15分		●						
	生食	100 mL	点滴静注	30分		●						
	ドキシソルビシン	50 mg/m ²	点滴静注			●						
	生食	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注			●						
	プレドニン	100 mg/日	内服			●	●	●	●	●		

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1471H

診療科 申請医師 備考欄

LPola+R-CHP(2-6コース目)1日投与

未治療のDLBCL

治療目的

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注	day1
	1mg/mLに調整			
ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	day1
ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注	day1
エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注	day1
プレドニン	100	mg/bd	内服	day1-5

投与周期 21日

休薬

R	薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
	アタラックスP	25	mg	内服		●							
	カロナール	400	mg	内服		●							
	生食	100	mL	点滴静注		●							
	生食	337.5	mL/m ²	点滴静注		●							
	リツキシマブBS	375	mg/m ²	点滴静注		●							
				inotuzumab ozogamicin (寛解:2-6サイクル目)									
	生食	50	mL	点滴静注	30分	●							
	生食	100	mL	点滴静注		●							
	注射用水	0.09	mL/kg	点滴静注		●							
	ポライビー	1.8	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注	15分	●							
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
	ドキシソルビシン	50	mg/m ²	点滴静注		●							
	生食	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴静注		●							
	プレドニン	100	mg/bd	内服		●	●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1550S

診療科 申請医師

LIsa-Kd療法(1サイクル目)
多発性骨髄腫

備考欄

治療目的
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	day1,8,15,22
カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	day1,2
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day8,9,15,16
レナデックス	20	mg/bd	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日
休薬

薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)	day()
アタラックスP	25	mg/bd	内服		●		●		●		●		
カロナール	400	mg/bd	内服	inotuzumab oz	●		●		●		●		
ファモチジン	20	mg/bd	内服	inotuzumab oz	●		●		●		●		
レナデックス	20	mg/bd	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
(サークリサ投与15-60分前までに)													
生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●	●	●	●	●		
生食	250	mL	点滴静注		●		●		●		●		
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	175→400mg/h	●		●		●		●		
5% 糖液	100	mL	点滴静注	 	●		●		●				
5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●							
注射用水	10	mL/m	点滴静注		●	●							
カイプロリス	20	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●							
5% 糖液	100	mL	点滴静注				●	●	●	●			
注射用水	28	mL/m	点滴静注				●	●	●	●			
カイプロリス	56	mg/m ²	点滴静注	30分			●	●	●	●			

レジメン記入フォーマット

登録番号 L1550S

診療科 申請医師 備考欄

LIsa-Kd療法(2サイクル目以降)
多発性骨髄腫

治療目的
治療内容

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	day1,15
カイトロリス	56	mg/m ²	点滴静注	day1,2,8,9,15,16
レナデックス	20	mg/bd	内服	day1,2,8,9,15,16,22,23

投与周期 28日
休薬

F 薬品名・規格	投与量	単位	投与ル	点滴時間	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)	day(22)	day(23)	day()
アタラックスP	25	mg/bd	内服		●				●				
カロナール	400	mg/bd	内服	inotuzumab oz	●				●				
ファモチジン	20	mg/bd	内服	inotuzumab oz	●				●				
レナデックス	20	mg/bd	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	
(サークリサ投与15-60分前までに)													
生食	100	mL	点滴静注	 	●	●	●	●	●	●			
生食	250	mL	点滴静注		●				●				
サークリサ	10	mg/kg	点滴静注	175→400mg/h	●				●				
5% 糖液	100	mL	点滴静注	 	●				●				
5% 糖液	100	mL	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
注射用水	28	mL/m	点滴静注		●	●	●	●	●	●			
カイトロリス	56	mg/m ²	点滴静注	30分	●	●	●	●	●	●			

