

code	レジメン名
P010M	S-1 + GEM
P011M	S-1 + GEM 2投2休
P020L	GEM
P030L	GEM 2投1休
P040M	S-1 + GEM + RT
P050M	GC療法(胆道がん)
P060M	nab-パクリタキセル+ゲムシタビン併用療法
P070H	FOLFILINOX
P071H	mFOLFILINOX
P080M	nal-IRI+5-FU/LV
P090M	GCS療法
P100M	Durvalumab+GC(胆道がん)
P110S	Durvalumab維持療法(胆道がん)
P120M	Pembrolizumab+GC(胆道がん)
P130S	Pembrolizumab+G(Pembrolizumab+GC維持療法)(胆道がん)

レジメン記入フォーマット

登録番号 P010M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 S-1+GEM

対象疾患名 進行膵癌・胆道癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m ²	内服	dayday1-14
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,8

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●						
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
2	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注		●	●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●						
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 P011M

診療科
 申請医師
 備考欄

レジメン名 S-1+GEM 2投2休

対象疾患名 進行膵癌・胆道癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m ²	内服	day1-14
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1,15

投与周期 28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-14)	Day(15)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	15分	●		●					
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
3	生食	100	mL	点滴静注		●		●					
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●					
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 P040M

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 S-1+GEM+RT

対象疾患名 局所進行膵癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	60	mg/m ²	内服	day1-14
	ゲムシタビン	600	mg/m ²	点滴静注	day1,8
	放射線治療	1.8	Gr		28 fractions

投与周期 × 2コース 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2-7)	Day(8)	Day(9-14)			
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●		●				
2	グラニセトロンバッグ	1	mg	点滴静注		●		●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●		●				
3	生食	100	mL	点滴静注		●		●				
	ゲムシタビン	600	mg/m ²	点滴静注	30分	●		●				
	S-1	60	mg/m ²	内服		●	●	●	●			
	放射線治療					●day1-5		●day8-12				

レジメン記入フォーマット

登録番号 P070H

診療科 申請医師 備考欄

レジメン名 FOLFIRINOX

対象疾患名 治癒切除不能膵癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	180	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m ²	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	2時間	●							
5-1	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	2時間	●							
5-2	イリノテカン	180	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	90分	●							
6	5FU	400	mg/m ²	急速静注		●							
	生食	50	mL	急速静注	5分	●							
7	5FU	2400	mg/m ²	持続静注		●							
	ヘパリンナトリウム注N	5000	単位	持続静注		●							
	生食	合計で150mL		持続静注	3.7mL/H	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 P071H

診療科 申請医師

レジメン名 mFOLFIRINOX

対象疾患名 治癒切除不能膵癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注	day1
	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day(4)	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	フラッシュ		●							
4	オキサリプラチン	85	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	2時間	●							
5-1	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	2時間	●							
5-2	イリノテカン	150	mg/m ²	点滴静注		●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注	90分	●							
6	5FU	2400	mg/m ²	持続静注		●							
	ヘパリンナトリウム注N	5000	単位	持続静注		●							
	生食	合計で150mL		持続静注	3.7mL/H	●							
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●				

レジメン記入フォーマット

登録番号 P080M

診療科 申請医師

レジメン名

対象疾患名

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オニバイド	70	mg/m ²	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	day1
	5FU	2400	mg/m ²	持続静注	day1-3

投与周期

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(2)	Day(3)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
1	生食	100	mL	点滴静注	90分	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
4	生食	500	mL	点滴静注		●							
	オニバイド	70	mg/m ²	点滴静注	90分	●							
5	生食	50	mL	点滴静注	フラッシュ	●							
	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
6	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴静注	2時間	●							
	5FU	2400	mg/m ²	持続静注		●							
7	ヘパリンナトリウム注N	5000	単位	持続静注		●							
	生食	合計で150mL		持続静注	3.7mL/H	●							

レジメン記入フォーマット

登録番号 P100M

診療科		申請医師	
レジメン名	Durvalumab+GC (胆道がん)		
対象疾患名	切除不能進行胆道癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	イミフィンジ	1500	mg/body	点滴静注	day1
	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注	day1. 8
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1. 8

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●	●						
2	生食	500	mL	点滴静注	60分	●	●						
3	イミフィンジ	1500	mg	点滴静注		●							
	生食	100	mL	点滴静注	60分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注	60分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
6	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注		●	●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●						
7	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注		●	●						
	生食	250	mL	点滴静注	60分	●	●						
8	生食	500	mL	点滴静注	60分	●	●						

レジメン記入フォーマット

登録番号 P120M

診療科		申請医師	
レジメン名	Pembrolizumab+GC(胆道がん)		
対象疾患名	切除不能進行胆道癌		
治療目的	<input type="checkbox"/> 術前 <input type="checkbox"/> 術後補助 <input checked="" type="checkbox"/> 再発・進行		

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	キイトルーダ	200	mg/body	点滴静注	day1
	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注	day1. 8
	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注	day1. 8

投与周期 21日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day(1)	Day(8)	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()	Day()
						●	●						
1	生食	100	mL	点滴静注	60分	●	●						
2	生食	500	mL	点滴静注	60分	●	●						
3	キイトルーダ	200	mg	点滴静注		●							
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●							
4	生食	50	mL	点滴静注	60分	●							
5	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●	●						
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●	●						
6	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴静注		●	●						
	生食	100	mL	点滴静注	30分	●	●						
7	シスプラチン	25	mg/m ²	点滴静注		●	●						
	生食	250	mL	点滴静注	60分	●	●						
8	生食	500	mL	点滴静注	60分	●	●						

