

code	レジメン名
<a href="#">S010H</a>	S-1 + CDDP
<a href="#">S020L</a>	S-1+DTX (進行再発)
<a href="#">S030M</a>	S-1 + CPT-11
<a href="#">S040L</a>	weekly PTX
<a href="#">S050H</a>	CPT-11 + CDDP
<a href="#">S060M</a>	biweekly CPT-11
<a href="#">S070M</a>	MTX + 5FU
<a href="#">S080M</a>	CPT-11単剤
<a href="#">S090H</a>	XP + Trastuzumab(初回)
<a href="#">S091H</a>	XP + Trastuzumab(2回目以降)
<a href="#">S100S</a>	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(初回)
<a href="#">S101S</a>	SOX + Trastuzumab (OX抜き)(2回目以降)
<a href="#">S110L</a>	nab-PTX
<a href="#">S120H</a>	SP+Trastuzumab (初回)
<a href="#">S121H</a>	SP+Trastuzumab (2回目以降)
<a href="#">S130M</a>	胃癌SOX
<a href="#">S140S</a>	Ramucirumab
<a href="#">S150L</a>	Ramucirumab+PTX
<a href="#">S160M</a>	胃癌XELOX
<a href="#">S170S</a>	Nivolumab単剤(胃癌)(2W)
<a href="#">S171S</a>	Nivolumab単剤(胃癌)(4W)
<a href="#">S180M</a>	XELOX + Trastuzumab(初回)
<a href="#">S181M</a>	XELOX + Trastuzumab (2回目以降)
<a href="#">S190L</a>	Weekly nab-PTX
<a href="#">S200M</a>	SOX + Trastuzumab (初回)
<a href="#">S201M</a>	SOX + Trastuzumab (2回目以降)
<a href="#">S210M</a>	mFOLFOX6(胃癌)
<a href="#">S220L</a>	Ramucirumab+nab-PTX
<a href="#">S230L</a>	S-1+DTX(術後補助)
<a href="#">S240H</a>	Trastuzumab Deruxtecan(胃癌)
<a href="#">S250M</a>	Nivolumab+SOX
<a href="#">S260M</a>	Nivolumab+XELOX
<a href="#">S270M</a>	Nivolumab+FOLFOX
<a href="#">S280H</a>	Zolbetuximab+XELOX(初回)
<a href="#">S281H</a>	Zolbetuximab+XELOX(2回目以降)
<a href="#">S290H</a>	Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)
<a href="#">S291H</a>	Zolbetuximab+mFOLFOX6(2回目以降)
<a href="#">S300M</a>	Pembrolizumab+XELOX

## レジメン記入フォーマット

登録番号 S010H

診療科       申請医師       備考欄  
 レジメン名 S-1+CDDP  
 対象疾患名 進行胃癌  
 治療目的  術前  術後補助  再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴	8
	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-21

投与周期 35日      休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day(1-7)	Day( 8 )	Day( 9-10 )	Day(11)	Day(12-21)	Day(22-35)	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>2時間</del>		●						
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
4	生食	50 mL	フラッシュ			●						
5	パロノセトロンバック	0.75 mg	点滴静注			●						
	アロカリス	235 mg	点滴静注			●						
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分		●						
6	生食	50 mL	フラッシュ			●						
7	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注			●						
	生食	400 mL	点滴静注	2時間		●						
8	ソルラクト	500 mL	点滴静注			●						
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間		●						
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間			●					
	S-1	80 mg/m <sup>2</sup>	内服		●	●	●	●	●			
	デカドロン	8 mg					●	●				







# レジメン記入フォーマット

診療科   
 レジメン名 CPT-11+CDDP  
 対象疾患名 進行胃癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

申請医師

備考欄

登録番号 S050H

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	irinotecan	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴	1,15
	cisplatin	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴	1

投与周期 28日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量		投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2 )	Day( 3 )	Day( 4 )	Day( 15 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>2時間</del>	●				●				
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●								
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●								
4	生食	50	mL	フラッシュ		●								
5	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注		●								
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●								
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●								
6	生食	50	mL	フラッシュ		●								
7	パロノセトロンバック	0.75	mg	点滴静注						●				
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分					●				
8	irinotecan	70	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●				●				
	5%糖液	250	mL	点滴静注	90分	●				●				
9	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●								
	生食	400	mL	点滴静注	2時間	●								
10	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●	●	●						
	プリンペラン	1	A	点滴静注	2時間	●	●	●						
11	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●	●	●						
12	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●	●	●						
	デカドロン	8	mg	内服			●	●	●					









# レジメン記入フォーマット

登録番号 S090H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 XP+Trastuzumab (初回)

対象疾患名 進行胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup> /日	内服	1-14

投与周期 21日

休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3 )	Day(4)	Day(5-14)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>2時間</del>	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8	mg/kg	点滴静注	90分	●							
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup> /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

# レジメン記入フォーマット

登録番号 S091H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 XP+Trastuzumab (2回目以降)

対象疾患名 進行胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	1
シスプラチン	60-80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1
カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup> /日	内服	1-14

投与周期 21日

休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルー	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3 )	Day(4)	Day(5-14)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>2時間</del>	●							
2	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7	生食	250	mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6	mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
8	生食	400	mL	点滴静注		●							
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500	mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20	mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500	mL	点滴静注	2時間		●						
	カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup> /日	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8	mg	内服			●	●					







# レジメン記入フォーマット

登録番号 S120H

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 SP+Trastuzumab (初回)

対象疾患名 胃癌 (HER2-positive)

治療目的  術前  術後補助  再発・進行

薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
S-1	80-120	mg/m <sup>2</sup>	内服	day1-14
シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
トラスツズマブBS	8	mg/kg		day1

投与周期 21日

休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day(5-14)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>2時間</del>	●							
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンバツ	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ		●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	8 mg/kg	点滴静注	90分	●							
8	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120 mg/m <sup>2</sup>	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 S121H

診療科  申請医師

レジメン名 SP+Trastuzumab(2回目以降)

対象疾患名 胃癌(HER2-positive)

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	S-1	80-120	mg/m <sup>2</sup>	内服	day1-14
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	トラスツズマブBS	6	mg/kg		day1

投与周期 21日

休薬 7日

Rp	薬品名・規格	投与量	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( 4 )	Day(4-14)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100 mL	点滴静注	<del>2時間</del>	●							
2	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
3	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間	●							
4	生食	50 mL	フラッシュ		●							
5	パロノセトロンパック	0.75 mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235 mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9 mg	点滴静注	30分	●							
6	生食	50 mL	フラッシュ		●							
7	生食	250 mL	点滴静注		●							
	トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴静注	90→30分	●							
8	シスプラチン	60 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	生食	400 mL	点滴静注	2時間	●							
9	ソルラクト	500 mL	点滴静注		●							
	フロセミド	20 mg	点滴静注	2時間	●							
10	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
11	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間	●							
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	ソルラクト	500 mL	点滴静注	2時間		●						
	S-1	80-120 mg/m <sup>2</sup>	内服		●	●	●	●				
	デカドロン	8 mg	内服			●	●					



























## レジメン記入フォーマット

登録番号 S210M

診療科  申請医師  備考欄

レジメン名 mFOLFOX6(胃癌)

対象疾患名 進行再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	day1-2

投与周期  休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day( 2,3 )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●	●	●	●	●	●	●	●
1	生食	100	mL	ポート	<del> </del>	●							
2	パロノセトロンパック	0.75	mg	ポート		●							
	デカドロン	6.6	mg	ポート	15分	●							
3-1	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
3-2	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	ポート		●							
	5%糖液	250	mL	ポート	2時間	●							
4	5FU	400	mg/m <sup>2</sup>	ポート		●							
	生食	50	mL	ポート	5分	●							
5	5FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	ポート		●	●						
	ヘパリンナトリウム注M	5000	単位	ポート		●	●						
	生食	合計で150	mL	ポート	3.7mL/h	●	●						













## レジメン記入フォーマット

登録番号 S270M

診療科  申請医師

レジメン名 Nivolumab+FOLFOX

対象疾患名 Her2陰性切除不能進行再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	day1-2

投与周期 14日 休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
						●							
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	生食	100	mL	点滴静注		●							
	オブジーボ	240	mg/body	点滴静注	30分	●							
3	生食	50	mL	点滴静注		●							
4	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	6.6	mg	点滴静注	15分	●							
5-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
5-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
6	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	5分	●							
7	5FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●	●						





### レジメン記入フォーマット

登録番号 | S290H

診療科  申請医師   
 レジメン名 Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)  
 対象疾患名 HER2陰性 CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌  
 治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ピロイ	800	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	day1-2

投与周期 | 14日

休薬 |

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day(4)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	ポララミン	5	mg	shot	shot	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	生食	360	mL/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	注射用水	40	mL/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	ピロイ	800	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	院内プロトコル参照	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
8	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	5分	●							
9	5FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●	●						
10	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

## レジメン記入フォーマット

登録番号 S291H

診療科  申請医師

レジメン名 Zolbetuximab+mFOLFOX6(2回目以降)

対象疾患名 HER2陰性 CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌

治療目的 術前 術後補助 再発・進行

備考欄

治療内容	薬品名	標準投与量	単位	投与経路	投与日
	ピロイ	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1
	5FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1
	5FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴	day1-2

投与周期 14日

休薬

Rp	薬品名・規格	投与量	単位	投与ルート	点滴時間	Day( 1 )	Day(2-3)	Day(4)	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )	Day( )
1	生食	100	mL	点滴静注	<del>30分</del>	●							
2	パロノセトロンバッグ	0.75	mg	点滴静注		●							
	アロカリス	235	mg	点滴静注		●							
	デカドロン	9.9	mg	点滴静注	30分	●							
3	ポララミン	5	mg	shot	shot	●							
4	生食	50	mL	フラッシュ		●							
5	生食	180	mL/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	注射用水	20	mL/m <sup>2</sup>	点滴静注		●							
	ピロイ	400	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	院内プロトコル参照	●							
6	生食	50	mL	フラッシュ		●							
7-1	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
7-2	5%糖液	250	mL	点滴静注		●							
	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	●							
8	生食	50	mL	急速静注		●							
	5FU	400	mg/m <sup>2</sup>	急速静注	5分	●							
9	5FU	2400	mg/m <sup>2</sup>	持続点滴		●							
	ヘパリンナトリウム注	5000	単位	持続点滴		●							
	生食	合計で150	mL	持続点滴	3.7mL/h	●	●						
10	デカドロン	8	mg	内服			●	●					

